

deciduis, petiolo 1 cm. longo, lamina 17-30 cm. longa, 4-6 cm. lata, lineari-oblonga, basi acuta, apice breviter acuminata, supra pallide viridia, subtus pallidiora, subflavida, chartacea, costulis crebis approximatis, nervis intermediis parallelis.

Nom vern. : *Ko-ace* (Guinée française).

GUINÉE FRANÇAISE : Sankaran [*Pobéguin* 843].

DESCRIPTIONS DE QUELQUES MIMUSOPÉES

(D'après les documents de L. Pierre).

1. *Lecomtedoxa ogouensis* Syn. : *Mimusops ogouensis* Pierre mss.

Ramulis teretibus, glabris ; foliis, ad apicem ramulorum densissime confertis, graciliter petiolatis, basi cuneatis, acumine obtuso, concoloribus, chartaceis, glabris ; costulis, utrinque 12-14, ad marginem arcuato-confluentibus, parum conspicuis ut nervis ; stipulis linearibus, rigidis, deciduis ; (petiolo 6-8 mm. longo, lamina 5-7,5 cm. longa, 1,5-3,5 cm. lata). Pedicellis 10 mm. longis, 1-2 in axillis foliorum, valde approximatis, confertis, glabris. Sepalis 5 quincuncialibus, 3 exterioribus ovato-lanceolatis, acutis, utrinque glabris, 3 mm. longis, interioribus tenuioribus ; corolla 3,5 mm. alta, 5 lobis, ovato-lanceolatis, marginibus involutis, glabris 2 mm. longis, appendicibus 2, linearibus acutis æquilongis ; tubo 1 mm. 5 alto ; staminodiis 5 ovato-acutis, utrinque minute pubescentibus ; staminibus 5, filamentis 3/4 mm. longis, antheri 1 mm. 1/4 altis, ovato-lanceolatis, cordatis. Ovario 5-locul. 0,5 mm. alto, griseo-velutino, stylo 3 mm. 5 longo, puberulo ; ovulis ad apicem ramulorum insertis fere atropis.

GABON : (Ogooué) à Samkita [*Thollon* 146].

2. *Labourdonnaisia Thouarsii* Pierre mss.

Sepala biseriata (3 + 3) dorso sericea vel pubescentia, intus glabra, exteriora subvalvata, 5 mm. alta, oblongo-lanceolata, acuta, intus tantum ad apicem pubescentia ; interiora, imbricata, ad basim angustata, 5 mm. alta. Corolla adulta 6 mm. 5 alta, tubo 1 mm. alto, rigide carnosus, 12 lobis, 5 mm.-5,5 mm. longis, biserialiter imbricatis, omnibus æquilongis, emarginatis, non laciniatis sed subfimbriatis. Staminodia 0. Stamina 12, petalis opposita, filamentis filiformibus antheris longioribus, antheris extrorsis, apice in acumen acutum productis. Ovarium 7-loculare, 7-costatum, griseo tomentosum, stylo sulcato glabro, apice vix denticulato, sepalis subæquilongis, loculis supra basim nascentibus. Pedunculus fructifer, 10 mm. longus, crassus ; fructus oblongus vel ovatus, 30 mm. altus, 25 mm. in diametro, basi calyce reflexo suffultus, monospermus. Semen adscendens, supra basim lateraliter affixum, ovato-lanceolatum, area derasa basilari, concava, ad marginem sinuata, cujus ad apicem hilo prominente ; tegumentum crustaceum, supra hilum 4-costatum, extra aream brunneo-nitidum. Embryo adscendens, cotyledonibus tenuibus ellipticis ; albumen crassum, superne bipartibile, ad basim circa caudiculam connatum. Folia obovata, basi attenuata, apice cordiformia, subtus glabra, supra pubescentia, costulis crebris nervisque paulo distinctis, petiolo 15 mm. longo, lamina 60 mm. longa, 50 mm. lata.

MADAGASCAR : [*Dupetit-Thouars*].

3. *Labourdonnaisia madagascariensis* Pierre mss.

Sepala biseriata (3 + 3), valvata in utraque seriei, oblonga, dorso argentéotomentosa, intus glabra. Corolla (in alabastro) lobis 11-13, imbricato convolutis, seu 2-3 exterioribus, omnibus æquilongis, oblongis, apice rotundatis, denticulato-fimbriatis, tubo duplo longioribus. Staminodia cum staminibus fauce inserta, alterna, in alabastro nana, apice bidentata, glabra; stamina uniseriata, petalis opposita, filamentis brevissimis, antheris oblongis cordatis. Ovarium 9-loculare, densissime griseo-tomentosum, in stylum glabrum decurrens, ovulis ad apicem loculorum insertis, micropyle infera. Folia obovata, basi attenuata, apice cordiformia, subtus glabra supra pubescentia, costulis crebris nervisque paulo distinctis, petiolo 12 mm. longo, lamina 60 mm. longo, 25 mm. lata.

MADAGASCAR : côte est [*Chapelier*].

OBS. : Cette espèce, désignée localement sous le nom de *Nantou*, donne une écorce qui sert à teindre en rouge le coton et la soie.

H. LECOMTE

SUR DEUX LORANTHUS DE CHINE

Dans ses *Plantae Chinenses Forrestianae* (Notes from the Royal Bot. Garden Edinburgh, XXV, 1913, p. 250), Diels a décrit deux espèces nouvelles de *Loranthus* : *L. Balfourianus* Diels (G. Forrest 453 et 2215) et *L. caloreas* Diels (G. Forrest n° 2600).

La plante de Forrest décrite par Diels sous le nom de *L. Balfourianus* est précisément la même que celle de Delavay (n° 2620) nommée par Van Tieghem *Phyllodesmis Delavayi* V. T. ¹. C'est à propos de cette plante que Van Tieghem a créé le genre *Phyllodesmis*, en raison de la disposition des feuilles en touffes sur la tige.

Si ce botaniste ne fournit pas la diagnose de la plante de Delavay, il faut reconnaître qu'il donne plusieurs caractères qui viennent utilement compléter la description de Diels :

« Elle a deux sortes de rameaux. Sur les rameaux longs, munis de côtes saillantes et à écorce noire, les feuilles sont isolées suivant 3/8. A l'aisselle de celles-ci, souvent après leur chute, se forment des rameaux très courts, commençant par une pérule de petites

1. V. Tieghem. *Sur le groupement des espèces en genres dans les Loranthus à calice gamosépale et à anthères basifixes ou Dendrophthoées*, in *Bull. Soc. bot. France*, t. XLII (1895), p. 241.